

Литература

Андреев В.А. 2007. О питании птиц ягодами рябины *Sorbus aucuparia* в Архангельске // *Рус. орнитол. журн.* **16** (351): 434-435.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 1063: 3347-3348

Первая встреча египетской цапли *Vibulcus ibis* на Имеретинской низменности

И.В.Борель

Ирина Витальевна Борель. Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности, ул. Ленина, 96, Сочи, 354340, Россия. Email: ornitoparksochi@outlook.com

Поступила в редакцию 12 ноября 2014

История изучения египетской цапли *Vibulcus ibis* в Краснодарском крае насчитывает уже более 50 лет (Строков 1960). В последнее время здесь происходит экспансия этого вида (Мнацеканов, Найданов 2013). Однако в пределах Имеретинской низменности, являющейся важным местом остановки многих птиц во время миграций, египетская цапля отмечена ещё не была.



Египетская цапля *Vibulcus ibis* в природном орнитологическом парке на Имеретинской низменности. 7 октября 2014. Фото Л.М.Шагарова.

Впервые две египетские цапли были зарегистрированы на берегу озера в природном орнитологическом парке на Имеретинской низменности 5 мая 2014. Они держались неподалёку от стаи малых белых цапель *Egretta garzetta*, однако смешанную стаю с ними не образовы-

вали. Во время осенней миграции одна египетская цапля была замечена в орнитологическом парке 6 и 7 октября 2014 (см. рисунок).

Литература

- Строков В.В. 1960. Птицы наземных ландшафтов Сочи-Мацестинского курортного района // *Охрана природы и озеленение* 4: 121-133.
- Мнацеканов Р.А., Найданов И.С. 2013. Современное состояние египетской цапли *Bubulcus ibis* в Краснодарском крае // *Рус. орнитол. журн.* 22 (952): 3467-3471.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 1063: 3348-3349

Красноспинная горихвостка *Phoenicurus erythronotus* ест ягоды девичьего винограда *Parthenocissus quinquefolia*

Н.Н.Березовиков

Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.
E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 13 ноября 2014

Красноспинная горихвостка *Phoenicurus erythronotus* – одна из характерных зимующих птиц подгорной зоны Тянь-Шаня (Зарудный, Кореев 1906; Шнитников 1949; Грачёв 1964; Шульпин 1965; Ковшарь 1966, 1979; Бородихин 1968; Кузьмина 1970; Чаликова 2008). В предгорьях Заилийского Алатау она появляется в октябре, обычно после первой волны похолоданий и снегопадов в горах.

С этого времени красноспинные горихвостки встречаются в садах и парках города Алматы и в древесно-кустарниковых насаждениях посёлков, а также в садово-огородных участках дачных массивов и лесополосах всей предгорной полосы от Заилийского Алатау до реки Или. Но особенно часто эти птицы встречаются в тугаях речек в нижних частях ущелий и в предгорьях, оставаясь в них на зимовку.

В этот период красноспинные горихвостки переходят на растительную пищу, среди которой встречаются семена злаков, гречишных, бобовых, шиповника и брионии (Янушевич и др. 1960; Пэк, Федянина 1961; Ковшарь 1966; Кузьмина 1970). Однако излюбленная их пища в это время – плоды облепихи *Hipporhae rhamnoides* и барбариса *Berberis iliensis*. По зарослям этих кустарников красноспинных горихвосток можно встречать в течение всей зимы.